

⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift
⑪ DE 3132885 A1

⑤① Int. Cl. 3:
A61K7/13

②① Aktenzeichen:
②② Anmeldetag:
②③ Offenlegungstag:

P 31 32 885.7
20. 8. 81
3. 3. 83


⑦① Anmelder:
Wella AG, 6100 Darmstadt, DE

⑦② Erfinder:
Clausen, Thomas, Dr., 6108 Weiterstadt, DE

DE 3132885 A1

⑤④ Mittel und Verfahren zur Färbung von Haaren

Mittel und Verfahren zur oxidativen Färbung von Haaren auf der Basis einer Entwicklersubstanz-Kupplersubstanz-Kombination, wobei als Kupplersubstanz mindestens ein 3,5-Diaminopyridinderivat der allgemeinen Formel



in der R¹ und R² unabhängig voneinander CH₃, C₂H₅ oder C₂H₄OH bedeuten und R³ Hydrogen, C₁-C₄-Alkyl oder C₁-C₄-Hydroxyalkyl darstellt, auch in Form der physiologisch verträglichen Salze, verwendet wird. In den Haarfärbemitteln sollen die erfindungsgemäßen Kupplersubstanzen, von denen das 3,5-Diamino-2,6-dimethoxypyridin bevorzugt wird, in einer Konzentration von 0,01 bis 3,0 Gew.%, insbesondere 0,1 bis 2,0 Gew.%, vorhanden sein. Die Kupplersubstanzen gemäß der Formel (I) sind lagerbeständig, gut in Wasser löslich und haben toxikologisch sowie dermatologisch günstige Eigenschaften. Die Kupplersubstanzen nach Formel (I) liefern in Kombination mit 1,4-Diaminobenzol oder dessen Derivaten sehr intensive blau-schwarze Töne ohne Rotanteil und in Kombination mit 4-Aminophenol kräftig leuchtende Gold-orangetöne.


(31 32 885)

DE 3132885 A1

WELLA AG
Berliner Allee 65
6100 Darmstadt

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Mittel zur oxidativen Färbung von Haaren auf
der Basis einer Entwicklersubstanz-Kuppler-
substanz-Kombination sowie gegebenenfalls
anderer üblicher Farbkomponenten und üblicher
Zusätze, d a d u r c h g e k e n n z e i c h -
n e t , daß es als Kupplersubstanz mindestens
ein 3,5-Diaminopyridinderivat der allgemeinen
Formel I



- wobei R^1 und R^2 unabhängig voneinander CH_3 ,
 C_2H_5 oder C_2H_4OH bedeuten und R^3 Hydrogen,
 C_1 - C_4 -Alkyl oder C_1 - C_4 -Hydroxyalkyl darstellt,
auch in Form der physiologisch verträglichen
Salze, enthält.

2. Mittel nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß es die Kuppler-
substanz der allgemeinen Formel I in einer
Menge von etwa 0,01 bis 3,0 Gew. %, vorzugsweise
0,1 bis 2,0 Gew. %, enthält.

3. Mittel nach Anspruch 1 und 2, dadurch g e -
k e n n z e i c h n e t , daß es als Kuppler-
substanz 3,5-Diamino-2,6-dimethoxypyridin ent-
hält.

4. Mittel nach Anspruch 1 bis 3, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß es zusätzlich eine
bekannte Kupplersubstanz enthält, welche ausge-
wählt ist aus Resorcin, 4-Chlorresorcin,
2-Methylresorcin, 2-Amino-4-(β -hydroxyethylamino)-
anisol, 2,4-Diaminophenylethanol, 2,4-Diämino-
phenoxyethanol, 2,4-Diaminoanisol, 2,4-Diamino-
phenetol, 1,5-Dihydroxytetralin, m-Aminophenol,
3-Amino-2-methylphenol, 3-Amino-6-methylphenol,
4-Hydroxy-1,2-methyldioxybenzol und 4-Amino-
1,2-methyldioxybenzol.
5. Mittel nach Anspruch 1 bis 4, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß die Entwicklersubstanz
ausgewählt ist aus 1,4-Diaminobenzol, 2,5-Diamino-
toluol, 2,5-Diaminoanisol, 2,5-Diaminobenzylalkohol,
3-Methyl-4-aminophenol und 4-Aminophenol.
6. Mittel nach Anspruch 1 bis 5, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß die Gesamtmenge der
Kupplersubstanz-Entwicklersubstanz-Kombination etwa
0,1 bis 5,0 Gew.%, vorzugsweise 0,5 bis 3,0 Gew. %,
beträgt.
7. Mittel nach Anspruch 1 bis 6, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß es eine Farbkomponente
enthält, welche ausgewählt ist aus 6-Amino-2-
methylphenol, 6-Amino-3-methylphenol, 6-Amino-
3-ethoxyphenol, Diamond Fuchsin (C.I. 42 510),
Leather Ruby HF (C.I. 42 520), 2-Nitro-1,4-diamino-
benzol, 2-Amino-4-nitrophenol, 2-Amino-5-nitro-
phenol, Acid Brown 4 (C.I. 14 805), Acid Blue 135
(C.I. 13 385), Disperse Red 15 (C.I. 60 710),
Disperse Violet 1 (C.I. 61 100), 1,4,5,8-Tetra-
aminoanthrachinon und 1,4-Diaminoanthrachinon.

10.08.81

3132885

- 3 -

8. Mittel nach Anspruch 1 bis 7, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , daß es zusätzlich
Antioxidantien, vorzugsweise Ascorbinsäure oder
Natriumsulfit, enthält.

9. Mittel nach Anspruch 1 bis 8, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , daß es einen
üblichen Zusatz enthält, welcher ausgewählt ist
aus Wasser, niederen aliphatischen Alkoholen,
Fettalkoholsulfaten, Alkylsulfonaten, Alkyl-
benzolsulfonaten, Alkyltrimethylammoniumsalzen,
Alkylbetainen, oxethylierten Fettalkoholen,
oxethylierten Nonylphenolen, Fettsäurealkanolamiden,
oxethylierten Fettsäureestern, höheren Fettalko-
holen, Stärke, Cellulosederivaten, Vaseline,
Paraffinöl, Fettsäuren, Lanolinderivaten,
Cholesterin, Pantothenensäure, Betain, Natriumhydro-
xid, Kaliumhydroxid, Ammoniak, Monoethanolamin und
Triethanolamin.

10. Mittel nach Anspruch 1 bis 9, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , daß es einen pH-Wert
von 8,0 bis 11,5 aufweist.

11. Verfahren zur oxidativen Färbung von Haaren,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß
man ein Haarfärbemittel gemäß den Ansprüchen 1
bis 10 nach Zugabe eines Oxidationsmittels, ins-
besondere Hydrogenperoxid, auf die Haare auf-
bringt, etwa 10 bis 45 Minuten lang bei einer
Temperatur von 15 bis 50° C einwirken läßt, an-
schließend die Haare spült, gegebenenfalls wäscht
und nachspült, und sodann trocknet.

W E L L A

Aktiengesellschaft

Darmstadt, den 18.08.1981

5 Mittel und Verfahren zur Färbung von Haaren

Gegenstand der Erfindung sind Mittel und Verfahren zur oxidativen Färbung von Haaren auf der Basis von Entwickler- und Kupplersubstanzen, wobei als Kuppler-
10 substanz ein Derivat des 3,5-Diaminopyridins verwendet wird.

Für die Haarfärbung haben Oxidationsfarbstoffe eine wesentliche Bedeutung erlangt. Die Färbung entsteht
15 hierbei durch Reaktion bestimmter Entwicklersubstanzen mit bestimmten Kupplersubstanzen in Gegenwart eines geeigneten Oxidationsmittels.

Als Entwicklersubstanzen werden bevorzugt 2,5-Diamino-
20 toluol, 4-Aminophenol und 1,4-Diaminobenzol verwendet, jedoch haben auch 2,5-Diaminoanisol, 2,5-Diaminobenzylalkohol und 2-(β -Hydroxyethyl)-1,4-diaminobenzol eine gewisse Bedeutung erlangt. In bestimmten Fällen kann auch Tetraaminopyrimidin als Entwicklersubstanz
25 eingesetzt werden. Die bevorzugt verwendeten Kupplersubstanzen sind *L*-Naphthol, Resorcin, 4-Chlorresorcin, m-Aminophenol, 5-Amino-o-kresol und Derivate des m-Phenylendiamins wie 2,4-Diaminophenetol und 2,4-Diaminoanisol. Diese Derivate sowie das m-Phenylendia-
30 min selbst haben hierbei wegen ihrer Fähigkeit, bei der oxidativen Kupplung mit 1,4-Diaminobenzol bzw. 1,4-Diaminobenzolderivaten Blautöne zu erzeugen, als sogenannte Blaukuppler Bedeutung erlangt.


35 An Oxidationsfarbstoffe, die zum Färben von menschlichen Haaren Verwendung finden, sind zahlreiche besondere Anforderungen gestellt. So müssen sie in toxikologischer und dermatologischer Hinsicht unbedenk-

lich sein und die Erzielung von Färbungen in der gewünschten Intensität ermöglichen. Weiterhin ist es erforderlich, daß durch Kombination geeigneter Entwickler- und Kupplerkomponenten eine breite Palette unterschiedlicher Farbnuancen erzeugt werden kann. Außerdem wird für die erzielbaren Haarfärbungen eine gute Licht-, Dauerwell-, Säure- und Reibechtheit gefordert. Auf jeden Fall aber müssen solche Haarfärbungen ohne Einwirkung von Licht, chemischen Mitteln und Reibung über einen Zeitraum von mindestens 4 bis 6 Wochen stabil bleiben.

Das zur Zeit in Haarfärbemitteln als Blaukuppler verwendete m-Phenylendiamin, dessen Derivate 2,4-Diaminotoluol und 2,4-Diaminoanisol sowie auch in neuerer Zeit empfohlene Blaukuppler, wie beispielsweise 1-Hydroxy-3-amino-6-chlorbenzol und 2,4-Diaminophenoxyethanol, können die vorstehend genannten Anforderungen jedoch nicht zufriedenstellend erfüllen.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Haarfärbemittel sowie ein Haarfärbeverfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem die gestellten Anforderungen besser erfüllt werden.

Hierzu wurde nun gefunden, daß Mittel zur oxidativen Färbung von Haaren auf der Basis einer Entwickler-substanz-Kupplersubstanz-Kombination sowie gegebenenfalls anderer üblicher Farbkomponenten und üblicher Zusätze, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß sie als Kupplersubstanz mindestens ein 3,5-Diaminopyridinderivat der allgemeinen Formel I



(I)

wobei R^1 und R^2 unabhängig voneinander CH_3 , C_2H_5 oder C_2H_4OH bedeuten und R^3 Hydrogen, C_1-C_4 -Alkyl oder C_1-C_4 -Hydroxyalkyl darstellt, auch in Form
5 der physiologisch verträglichen Salze enthalten, in hervorragendem Maße der gestellten Aufgabe gerecht werden.

Die als Kupplersubstanzen in den erfindungsgemäßen
10 Haarfärbemitteln enthaltenen 3,5-Diaminopyridinderivate der angegebenen Formel I, wie zum Beispiel 3,5-Diamino-2,6-dimethoxypyridin, 3,5-Diamino-2,6-diethoxypyridin und 3,5-Diamino-2,6-di-(β -hydroxyethyloxy)-pyridin, sind gut in Wasser löslich. Sie
15 weisen außerdem eine ausgezeichnete Lagerbeständigkeit, insbesondere als Bestandteil der hier beschriebenen Haarfärbemittel, auf.

In den Haarfärbemitteln sollen die erfindungsgemäßen
20 Kupplersubstanzen, von denen das 3,5-Diamino-2,6-dimethoxypyridin bevorzugt ist, in einer Konzentration von etwa 0,01 bis 3,0 Gew. %, vorzugsweise 0,1 bis 2,0 Gew. %, enthalten sein.

Außerdem können in den Haarfärbemitteln zusätzlich
25 bekannte Kupplersubstanzen, insbesondere Resorcin, 4-Chlorresorcin, 2-Methylresorcin, 2-Amino-4-(β -hydroxyethylamino)-anisol, 2,4-Diaminophenylethanol, 2,4-Diaminophenoxyethanol, 1,5-Dihydroxytetralin, m-Aminophenol, 3-Amino-2-methylphenol,
30 3-Amino-6-methylphenol, 4-Hydroxy-1,2-methylenedioxybenzol, 4-Amino-1,2-methylenedioxybenzol, 2,4-Diaminoanisol und 2,4-Diaminophenetol enthalten sein.

35

Von den bekannten Entwicklersubstanzen kommen als Bestandteil der erfindungsgemäßen Haarfärbemittel vor allem 1,4-Diaminobenzol, 2,5-Diaminotoluol, 5 2,5-Diaminoanisol, 2,5-Diaminobenzylalkohol, 3-Methyl-4-aminophenol und 4-Aminophenol in Betracht.

Die genannten Kuppler- und Entwicklersubstanzen können in den Haarfärbemitteln jeweils einzeln oder 10 im Gemisch miteinander enthalten sein.

Die Gesamtmenge der in den hier beschriebenen Haarfärbemitteln enthaltenen Entwicklersubstanz-Kuppler-substanz-Kombination soll etwa 0,1 bis 5,0 Gew. %, 15 vorzugsweise 0,5 bis 3,0 Gew. %, betragen.

Die Entwicklerkomponenten werden im allgemeinen in etwa äquimolaren Mengen, bezogen auf die Kupplerkomponenten, eingesetzt. Es ist jedoch nicht nachteilig, wenn die Entwicklerkomponente diesbezüglich 20 in einem gewissen Überschuß oder Unterschluß vorhanden ist. Besonders zur Erzielung matter Nuancen kann es gegebenenfalls günstig sein, die Entwicklerkomponente im Unterschluß zu verwenden.

Weiterhin können die Haarfärbemittel dieser Anmeldung zusätzlich andere Farbkomponenten, beispielsweise 6-Amino-2-methylphenol, 6-Amino-3-methylphenol und 6-Amino-3-ethoxyphenol, sowie ferner übliche 30 direktziehende Farbstoffe, zum Beispiel Triphenylmethanfarbstoffe wie Diamond Fuchsin (C.I. 42 510) und Leather Ruby HF (C.I. 42 520), aromatische Nitrofarbstoffe wie 2-Nitro-1,4-diaminobenzol, 2-Amino-4-nitrophenol und 2-Amino-5-nitrophenol, 35 Azofarbstoffe wie Acid Brown 4 (C.I. 14 805) und

Acid Blue 135 (C.I. 13 385), Anthrachinonfarbstoffe wie Disperse Red 15 (C.I. 60 710) und Disperse Violet 1 (C.I. 61 100), außerdem 1,4,5,8-Tetraaminoanthrachinon und 1,4-Diaminoanthrachinon enthalten.

Selbstverständlich können die Kuppler- und Entwicklersubstanzen sowie auch andere Farbkomponenten, sofern es Basen sind, in Form der physiologisch verträglichen Säureadditionssalze, wie beispielsweise als Hydrochlorid bzw. Sulfat oder - sofern sie aromatische OH-Gruppen besitzen - in Form der Salze mit Basen, zum Beispiel als Alkaliphenolate, eingesetzt werden.

Darüber hinaus können in den Haarfärbemitteln noch weitere übliche kosmetische Zusätze, beispielsweise Antioxidantien wie Ascorbinsäure oder Natriumsulfit, Parfümöle, Komplexbildner, Netzmittel, Emulgatoren, Verdicker, Pflegestoffe und andere vorhanden sein.

Die Zubereitungsform kann beispielsweise eine Lösung, insbesondere eine wäßrige oder wäßrig-alkoholische Lösung, sein. Die besonders bevorzugten Zubereitungsformen sind jedoch eine Creme, ein Gel oder eine Emulsion.

Ihre Zusammensetzung stellt eine Mischung der Farbstoffkomponenten mit den für solche Zubereitungen üblichen Zusätzen dar.


Übliche Zusätze in Lösungen, Cremes, Emulsionen oder Gelen sind zum Beispiel Lösungsmittel wie Wasser, niedere aliphatische Alkohole, beispielsweise Ethanol, Propanol und Isopropanol, oder Glykole

wie Glycerin und Glykolether wie Propylenglykol, weiterhin Netzmittel oder Emulgatoren aus den Klassen der anionischen, kationischen, amphoteren oder nicht-
5 ionogenen oberflächenaktiven Substanzen wie Fettalkoholsulfate, Alkylsulfonate, Alkylbenzolsulfonate, Alkyltrimethylammoniumsalze, Alkylbetaine, oxethylierte Fettalkohole, oxethylierte Nonylphenole, Fettsäurealkanolamide, oxethylierte Fettsäureester, ferner
10 Verdicker wie höhere Fettalkohole, Stärke, Cellulose-derivate, Vaseline, Paraffinöl und Fettsäuren sowie außerdem Pflegestoffe wie Lanolinderivate, Cholesterin, Pantothensäure und Betain. Die erwähnten Bestandteile werden in den für solche Zwecke üblichen Mengen verwendet, zum Beispiel die Netzmittel und Emulgatoren
15 in Konzentrationen von etwa 0,5 bis 30 Gewichtsprozent, während die Verdicker in einer Menge von etwa 0,1 bis 25 Gewichtsprozent in den Zubereitungen enthalten sein können.

20 Je nach Zusammensetzung können die erfindungsgemäßen Haarfärbemittel schwach sauer, neutral oder alkalisch reagieren. Insbesondere weisen sie einen pH-Wert im alkalischen Bereich zwischen 8,0 und 11,5 auf, wobei
25 die Einstellung vorzugsweise mit Ammoniak erfolgt. Es können aber auch organische Amine, zum Beispiel Monoethanolamin und Triethanolamin, oder auch anorganische Basen wie Natriumhydroxid und Kaliumhydroxid, Verwendung finden.

30 Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur oxidativen Färbung von Haaren vermischt man die Haarfärbemittel auf der Basis einer Entwicklersubstanz-Kupplersubstanz-Kombination sowie gegebenenfalls anderer üblicher Farb-
35

komponenten und üblicher Zusätze, dadurch gekennzeichnet, daß sie als Kuppler-
substanz mindestens ein 3,5-Diaminopyridinderivat
der allgemeinen Formel I.




wobei R^1 und R^2 unabhängig voneinander CH_3 , C_2H_5
oder C_2H_4OH bedeuten und R^3 Hydrogen, C_1-C_4 -Alkyl
oder C_1-C_4 -Hydroxyalkyl darstellt, auch in Form des
Salzes enthalten, kurz vor dem Gebrauch mit einem
Oxidationsmittel und trägt dieses Gemisch auf das
Haar auf. Als Oxidationsmittel zur Entwicklung der
Haarfärbung kommt hauptsächlich Hydrogenperoxid, bei-
spielsweise als 6 %ige wäßrige Lösung bzw. dessen
Additionsverbindungen an Harnstoff, Melamin oder
Natriumborat in Betracht. Man läßt das Gemisch bei
15 bis 50° C etwa 10 bis 45 Minuten lang, vorzugs-
weise 30 Minuten lang, auf das Haar einwirken,
spült sodann das Haar mit Wasser aus und trocknet.
Gegebenenfalls wird im Anschluß an diese Spülung
mit einem Shampoo gewaschen und eventuell mit
einer schwachen organischen Säure, wie zum Beispiel
Zitronensäure oder Weinsäure, nachgespült. Ab-
schließend wird das Haar getrocknet.

Die Herstellung der in den beschriebenen Haarfärbe-
mitteln enthaltenen 3,5-Diaminopyridinderivate ist
bekannt. Entsprechende Informationen können zum
Beispiel der deutschen Offenlegungsschrift 2 445 002
entnommen werden.

- 11 -

Nach einem weiteren Syntheseweg werden als Ausgangs-
substanzen das 2,6-Dichloro- oder 2,6-Dibromopyridin
eingesetzt. Durch nucleophile Substitution des Halo-
gens durch das entsprechende Alkoholat und an-
schließend Nitrierung gelangt man gemäß nachstehendem
Reaktionsschema zu dem entsprechenden 3,5-Dinitro-2,6-
dialkoxypyridin (III). Schließlich wird die so er-
haltene Dinitroverbindung durch Reduktion der Nitro-
Gruppen in die gewünschte 3,5-Diamino-2,6-dialkoxy-
verbindung (IV) überführt.



Die entsprechenden N-substituierten Derivate des
3,5-Diamino-2,6-dialkoxypyridins sind ebenfalls
nach üblichen in der präparativen organischen
5 Chemie-Literatur beschriebenen Syntheseschritten
zugänglich. Hierzu wird die 2,6-Dialkoxypyridinver-
bindung (II) zunächst mononitriert, und anschließend
reduziert man die Nitrogruppe zur Aminogruppe. Es
folgt die Monoalkylierung des Aminstickstoffs. Durch
10 erneute Nitrierung und nachfolgende Reduktion der
Nitrogruppe zur Aminogruppe gelangt man zum Endprodukt.

Hinsichtlich der färberischen Möglichkeiten bieten
die erfindungsgemäßen Haarfärbemittel je nach Art
15 und Zusammensetzung der Farbkomponenten eine breite
Palette verschiedener Farbnuancen, welche sich von
blonden über braune, aschige, matte, goldene bis
hin zu blauen und schwarzen Farbtönen erstreckt.
Hierbei zeichnen sich die Farbtöne durch ihre be-
20 sondere Farbintensität und Lichtechtheit aus.

Von wesentlicher Bedeutung ist der durch die Verwen-
dung der 3,5-Diaminopyridinderivate der angegebenen
Formel (I) in den hier beschriebenen Haarfärbemitteln
25 in toxikologischer und dermatologischer Hinsicht, zum
Beispiel gegenüber den bekannten Blaukupplern 2,4-
Diaminotoluol, 2,4-Diaminoanisol und m-Phenylendiamin,
erzielte Fortschritt. So zeigt die erfindungsgemäße
Kupplersubstanz 3,5-Diamino-2,6-dimethoxypyridin im
30 Ames-Test, im Gegensatz zu 2,4-Diaminotoluol oder 2,4-
Diaminoethylbenzol, keine mutagene Wirkung an
Salmonella typhimurium-Stämmen.

Die vorstehend angeführten Pyridinderivate liefern als
35 Kupplersubstanzen in Kombination mit den Entwickler-

substanzen 1,4-Diaminobenzol und dessen Derivaten
sehr intensive blauschwarze Töne ohne Rotanteil,
wie sie mit den für die Verwendung in Haarfärbemitteln
bekannten Kupplersubstanzen, wie zum Beispiel 2,4-
Diaminotoluol, 2,4-Diaminoanisol, 2,4-Diaminophenoxy-
ethanol, 2,6-Diaminotoluol, 2-Amino-4-(β -hydroxy-
ethylamino)-anisol oder 3-Amino-6-chlorphenol, nicht
erzielt werden können.

Liefert nämlich der zur Erzeugung von Matt- und Asch-
tönen unbedingt erforderliche Blaukuppler mit den vor-
stehend als Entwicklersubstanzen genannten 1,4-Diamino-
verbindungen rot- oder violettstichige Blautöne, so
wird die Erlangung von Matt- und Aschtönen unmöglich
oder sehr erschwert. Demgegenüber ist es wegen der
vorteilhaften Eigenschaften der anmeldungsgemäßen
Pyridinderivate, Blautöne ohne Rotanteil zu erzeugen,
nun problemlos möglich, die Haare dauerhaft in aschigen
oder matten Naturtönen zu färben, die auch am Licht
stabil bleiben und nicht wie die mit m-Phenylendiamin
hergestellten Nuancen nach Rot verschießen.

Ein weiterer Vorteil der in den erfindungsgemäßen Haar-
färbemitteln enthaltenen 3,5-Diaminopyridinderivate
besteht in dem breiten Spektrum der herstellbaren
Farbtöne. So lassen sich zum Beispiel in Kombination
mit 4-Aminophenol als Entwicklersubstanz kräftig
leuchtende, modische Goldorangeröne erzeugen, zu deren
Herstellung bisher Mischungen verschiedener Kuppler
eingesetzt werden mußten.

Schließlich ist mit Hilfe der erfindungsgemäßen Haar-
färbemittel auch eine Anfärbung von ergrautem, chemisch
nicht geschädigtem Haar ohne Probleme und mit sehr

guter Deckkraft möglich.

Die nachfolgenden Beispiele sollen den Gegenstand
5 der Erfindung näher erläutern.

B e i s p i e l e

10

<u>Beispiel 1</u>	Haarfärbemittel in Gelform
0,75 g	3,5-Diamino-2,6-dimethoxypyridin-di- hydrochlorid
0,70 g	2,5-Diaminotoluolsulfat
15 0,30 g	Ascorbinsäure
1,00 g	Hydroxyethylcellulose, hochviskos
5,00 g	Laurylalkohol-diglykoethersulfat, Natriumsalz (28 %ige wäßrige Lösung)
10,00 g	Ammoniak, 22 %ig
20 <u>82,25 g</u>	Wasser
100,00 g	

50 g des obigen Haarfärbemittels werden kurz vor dem
Gebrauch mit 50 ml Hydrogenperoxidlösung (6 %ig) ver-
25 mischt und das Gemisch anschließend auf weiße
menschliche Haare aufgetragen. Nach einer Einwirkungs-
zeit von 30 Minuten bei etwa 40° C wird mit Wasser ge-
spült und getrocknet. Das Haar ist tief blauschwarz
gefärbt.

30

35

- 15 -

	<u>Beispiel 2</u>	Haarfärbemittel in Gelform
	0,5 g	2,6-Di-(β -hydroxyethyloxy)-3,5-diaminopyridin-dihydrochlorid
5	0,5 g	2,5-Diaminotoluolsulfat
	0,3 g	Ascorbinsäure
	1,0 g	Hydroxyethylcellulose, hochviskos
	5,0 g	Laurylalkohol-diglykoläthersulfat, Natriumsalz (28 %ige wässrige Lösung)
10	10,0 g	Ammoniak 22 %ig
	<u>82,7 g</u>	Wasser
	100,0 g	

50 g des obigen Haarfärbemittels werden kurz vor dem Gebrauch mit 50 ml Hydrogenperoxidlösung (6 %ig) vermischt und das Gemisch anschließend auf blonde menschliche Haare aufgetragen. Nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40° C wird mit Wasser gespült und getrocknet. Das Haar ist in einem intensiven Blauton gefärbt.

	<u>Beispiel 3</u>	Haarfärbemittel in Gelform
	0,08 g	3,5-Diamino-2,6-dimethoxypyridin-dihydrochlorid
25	0,30 g	1,4-Diaminobenzol
	0,25 g	Resorcin
	0,30 g	Ascorbinsäure
	15,00 g	Ölsäure
	7,00 g	Isopropanol
30	10,00 g	Ammoniak, 22 %ig
	<u>67,07 g</u>	Wasser
	100,00 g	

Man vermischt kurz vor Gebrauch 50 g dieses Haarfärbemittels mit 50 ml Hydrogenperoxidlösung (6 %ig) und

läßt das Gemisch 30 Minuten lang bei 40° C auf weiße menschliche Haare einwirken. Danach wird mit Wasser gespült und getrocknet. Das Haar hat eine natürlich wirkende mittelmattblonde Färbung erhalten.

	<u>Beispiel 4</u>	Haarfärbemittel in Cremeform
	0,60 g	3,5-Diamino-2,6-dimethoxypyridin-dihydrochlorid
10	0,30 g	4-Aminophenol
	0,30 g	Natriumsulfit, wasserfrei
	3,50 g	Laurylalkohol-diglykoethersulfat, Natriumsalz (28 %ige wäßrige Lösung)
	15,00 g	Cetylalkohol
15	3,00 g	Ammoniak, 22 %ig
	<u>77,30 g</u>	Wasser
	100,00 g	

50 g dieses Haarfärbemittels werden kurz vor Gebrauch mit 50 ml Hydrogenperoxidlösung (6 %ig) vermischt und das Gemisch anschließend auf weiße menschliche Haare aufgebracht. Nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40° C wird zunächst mit Wasser, sodann mit einer verdünnten Zitronensäurelösung gespült und schließlich getrocknet. Das Haar ist in einem modischen gold-orangen Farbton gefärbt.

Alle in der vorliegenden Anmeldung angegebenen Prozentzahlen stellen Gewichtsprozente dar.

THIS PAGE BLANK (UPTQ)